

Estudo de plataforma de fase 2, randomizado, aberto usando um protocolo mestre para avaliar novas combinações de imunoterapia como tratamento de primeira linha em participantes com carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, PD-LI-positivo e recidivante/metastático

Estudo:
Galaxies_219885

Critérios de Inclusão:

- ✓ Carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço recidivado/metastático;
- ✓ PD-LI-positivo (análise via estudo);
- ✓ Doença mensurável pelo RECIST 1.1;
- ✓ ECOG 0 - I.

Critérios de Exclusão:

- ✓ Ter recebido terapia anterior com quaisquer inibidores de checkpoint imunológico, incluindo anticorpos ou medicamentos direcionados a PD-1, PD-L1, CTLA-4, TIGIT, CD96 ou outras vias de checkpoint imunológicas;
- ✓ Sangramento tumoral ativo;
- ✓ Ter apresentado progressão dentro de 4 meses após a conclusão do tratamento curativo;
- ✓ Metástases SNC não tratadas;

Braços do estudo:

- A) Monoterapia de dostarlimabe versus
- B) Dostarlimabe + belrestotug versus
- C) Dostarlimabe + GSK6097608 versus
- D) Dostarlimabe + belrestotug + GSK 6097608