

Um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego de MK7684 com pembrolizumabe como uma formulação concomitante (MK-7684A) versus monoterapia com pembrolizumabe como tratamento de primeira linha para participantes que apresentam câncer de pulmão de células não-pequenas metastático positivo para PD-L I.

Estudo:
MK7684A-003

Critérios de Inclusão:

- ✓ NSCLC metastático;
- ✓ Ausência de alteração em EGFR, ALK e ROS-I;
- ✓ PD-L I positivo (? : I O/o) - análise pelo estudo;
- ✓ Doença mensurável pelo RECIST I.I;
- ✓ ECOG 0 ou I.

Critérios de Exclusão:

- ✓ Ter recebido quimioterapia sistêmica anterior ou outra terapia antineoplásica direcionada ou biológica para seu NSCLC metastático;
- ✓ Ter recebido terapia anterior com um agente anti-PD-I, anti-PD-L I ou anti-PD-L2 ou com um agente direcionado a outro receptor estimulador ou coinibidor de células T;
- ✓ Ter recebido tratamento anterior com outro agente que tem como alvo a via do receptor TIGIT.

Braços do estudo:

- A)** Inibidor de TIGIT(MK7684) + Pembrolizumabe versus.
- B)** Pembrolizumabe.